

Giá Rai, ngày 28 tháng 02 năm 2020

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/2020
(V/v thông tin thuốc FORAIR 125 INHALER)

Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc *FORAIR 125 INHALER* có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

1.Tên thương mại:FORAIR 125 INHALER

2.Loại thuốc:Thuốc tác dụng trên đường hô hấp

3.Dạng thuốc và hàm lượng:

Bình xịt định liều:25mcg/125mcg

-Salmeterol xinafoate tương đương với Salmeterol.....25mcg

-Fluticasone propionat BP.....125mcg

- Tá dược: HFA 134A.

4.Dược lý và cơ chế tác dụng:

Salmeterol là một chất chủ vận thụ thể giao cảm β_2 có tác dụng kéo dài và có tính chọn lọc cao với một chuỗi dài gắn kết với mặt ngoài của thụ thể. Salmeterol tạo ra tác dụng giãn phế quản.

Fluticasone propionat: Là một Corticosteroid tổng hợp có hiệu lực trung bình, được sử dụng tại chỗ để làm giảm triệu chứng và cơn kịch phát của bệnh hen suyễn, và ít tác dụng phụ hơn khi dùng Corticoid đường toàn thân.

5.Dược động học

❖ *Salmeterol* chỉ tác dụng tại chỗ ở phổi, do vậy nồng độ thuốc trong huyết tương không biểu thị tác động trong điều trị. Thuốc dưới dạng khí dung:

-Tác dụng giãn phế quản xuất hiện sau 2-3 phút

- Đạt nồng độ tối đa 5- 15 phút

- Thời gian tác dụng 3- 4 giờ

- Đào thải qua nước tiểu trong vòng 24 giờ

❖ *Fluticasone propionate*

-Độ thanh thải huyết tương cao (1550ml/ phút)

- Thể tích phân bố khoảng 300l
- Thời gian bán thải ~ 8 giờ
- Gắn kết protein huyết tương 91%
- Đào thải qua thận dưới dạng chuyển hóa ~ 5%

Dạng tác dụng tại chỗ có thể dùng được ở người bệnh cường giáp, loạn nhịp tim, rối loạn tuần hoàn mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường.

6. Chỉ định:

- Hen suyễn mạn tính bao gồm cả trẻ em và người lớn
- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) bao gồm viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng.

7. Liều lượng và cách dùng

- Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Xịt 2 lần/ ngày
- Không điều chỉnh liều đối với người già hoặc bệnh nhân suy bị suy thận.
- Bệnh nhân phải được dùng thuốc thường xuyên ngay cả khi không có triệu chứng.

Cách dùng: *Không được dùng lại đột ngột khi đang điều trị với Forair*

1. Dùng thẳng bình xịt bằng ngón trỏ và ngón cái, lắc đều.
2. Thở đều ra và để miệng bình xịt vào miệng, giữa hai hàm răng.
3. Ngậm miệng bình xịt bằng môi, không được cắn.
4. Hơi ngửa đầu về phía sau, hít vào chậm đều đồng thời ấn xịt một liều trong khi tiếp tục hít vào đều và sâu.
5. Bỏ bình xịt ra, giữ hơi thở trong vòng ít nhất là 10 giây hay cho tới lúc nào còn thấy dễ chịu. Sau đó thở ra chậm.

8. Chống chỉ định

- Trẻ em < 12 tuổi
- Bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

9. Thận trọng

- Không được dùng lại đột ngột khi dùng Forair
- Forair không phải là thuốc điều trị triệu chứng hen cấp tính. Cũng như với thuốc đường hít chứa corticoid khác, Forair nên được dùng thận trọng trên bệnh nhân lao tiến triển hay lao tiềm ẩn.
- Nếu có dấu hiệu suy trực dưới đồi – tuyến yên – thượng thận như hạ huyết áp, buồn nôn, nôn, chóng mặt hoặc yếu, mệt nên ngừng thuốc hoặc giảm số lần dùng.

10. Thời kỳ có thai và cho con bú

- Cần cân nhắc nguy cơ và lợi ích đối với bào thai trước khi dùng thuốc cho phụ nữ mang thai

- Chưa có tài liệu để biết được thuốc có tiết vào sữa mẹ hay không, nhưng cả Salmeterol và Fluticasone propionat đều tiết vào sữa chuột. Vì vậy cần cân nhắc nguy cơ và lợi ích đối với trẻ nhỏ trước khi dùng thuốc đối với phụ nữ đang cho con bú.

11. Tương tác thuốc

- Không dùng chung với các thuốc ức chế mạnh cytochrome P450 3A4.

- Việc dùng đồng thời salmeterol và ketoconazol làm tăng đáng kể nồng độ salmeterol trong huyết tương.

12. Tác dụng không mong muốn:

- Loạn nhịp tim có thể thường xảy ra trên bệnh nhân nhạy cảm

- Có báo về triệu chứng đau khớp và các phản ứng quá mẫn, bao gồm nổi mẩn, phù và phù mạch.

- Khàn giọng và nấm Candida miệng và họng có thể xảy ra ở một vài bệnh nhân.

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT

KHOA DƯỢC

ĐV THÔNG TIN THUỐC

TLTK: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.