

Giá Rai, ngày 16 tháng 08 năm 2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 08/2022
(V/v thông tin thuốc **RABEPRAZOL 10mg**)

Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **RABEPRAZOL 10mg** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

1. Tên thương mại: BAROLE 10

2. Loại thuốc: Thuốc ức chế bơm proton

3. Dạng thuốc và hàm lượng: Viên nang cứng, hàm lượng 10mg.

4. Chỉ định, liều dùng, cách dùng:

- Điều trị triệu chứng bệnh trào ngược dạ dày – thực quản *không viêm thực quản*: 10mg/lần/ngày.
- Điều trị viêm loét do hội chứng trào ngược dạ dày – thực quản:
Người lớn: 20 mg/ngày trong 4 – 8 tuần.
- Điều trị *duy trì* chứng viêm loét do trào ngược dạ dày – thực quản:
10 - 20 mg/lần/ngày, phụ thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân.
- Điều trị loét dạ dày – tá tràng:
Người lớn: 20 mg/ngày trong 4 tuần.
- Phối hợp với các thuốc hợp lý khác để điều trị loét dạ dày – tá tràng do *H.Pylori*. Khuyến cáo kết hợp các thuốc trong phác đồ điều trị trong 7 ngày: 20 mg/lần x 2 lần/ngày (Sáng – tối).
- *Bệnh nhân suy gan thận*: không cần chỉnh liều.

Nên uống nguyên viên không nhai, nghiền hay cắt viên thuốc trước khi uống.

5. Chống chỉ định:

- Quá mẫn với thành phần của thuốc.
- Phụ nữ có thai và cho con bú

6. Thận trọng:

- Các đáp ứng điều trị với Rabeprazol không ngăn ngừa sự xuất hiện của các khối u ở dạ dày. Vì thế cần loại trừ khả năng có ung thư trước khi sử dụng thuốc.

TLTK: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc BAROLE, Dược thư quốc gia Việt Nam (2018), drugs.com

- Có thể xảy ra suy gan nặng, phỏng rộp trên da, đỏ da. Ngưng sử dụng thuốc khi có sự tái phát của các tổn thương trên da.
- Điều trị với các thuốc PPI, kể cả Rabeprazol, có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa với *Samonella*, *Campylobacter*, *Clostridium difficile*.
- Sử dụng thuốc 3 tháng đến 1 năm: có những biểu hiện nghiêm trọng của hạ magnesi máu như mệt mỏi, co cứng cơ, mê sảng, co giật, chóng mặt, loạn nhịp thất.
- Sử dụng thuốc liều cao và trên 1 năm: có thể tăng nguy cơ gãy xương hông, cổ tay và cột sống, chủ yếu xảy ra ở người già hoặc những người có các yếu tố nguy cơ khác.

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT

KHOA DƯỢC

ĐV THÔNG TIN THUỐC-DLS



Trần Siêm

DS. Lương Chất Lương

DS. Đặng Minh Hùng