

Giá Rai, ngày 04 tháng 08 năm 2022

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 08/2022
(V/v thông tin thuốc **SULPIRID**)

Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **SULPIRID** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

1. Chỉ định: Rối loạn lo âu lan tỏa (F41.1).

2. Liều lượng và cách dùng

- + Điều trị triệu chứng ngăn ngừa các triệu chứng lo âu ở người lớn đã thất bại với các điều trị thông thường: Liều hàng ngày: Uống **50 - 150 mg** trong tối đa 4 tuần.
- + Người cao tuổi: 50-100mg/lần x 2 lần/ngày
- + Trẻ em > 14 tuổi: Uống 3-5 mg/kg/ngày. Trẻ em < 14 tuổi: không có chỉ định
- + **Trường hợp suy thận:**

Độ thanh thải creatinine	Liều lượng
30-60 ml/phút	$\frac{2}{3}$ liều bình thường
10-30 ml/phút	$\frac{1}{2}$ liều bình thường
< 10 ml/phút	$\frac{1}{3}$ liều bình thường

3. Chống chỉ định

- Quá mẫn với sulpirid hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- U tuy thượng thận.
- Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp.
- Trạng thái thần kinh trung ương bị úc chế, hôn mê, ngộ độc rượu và thuốc úc chế thần kinh.
- Các u phụ thuộc prolactin (như adenom tuyến yên prolactin và ung thư vú).
- **Tương tác chống chỉ định khi sử dụng đồng thời với domperidone.**

4. Phụ nữ có thai và cho con bú:

- Phụ nữ có thai: không khuyến cáo sử dụng trong thai kì

TLTK: 1. *Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc*
2. *Dược thư quốc gia 2018*

- Sulpirid phân bố vào sữa mẹ với lượng tương đối lớn và có thể gây ADR đối với trẻ bú mẹ. Vì vậy phụ nữ đang cho con bú không nên dùng hoặc ngừng cho con bú nếu dùng thuốc.

*Đề nghị các khoa, phòng ghi đúng mã chẩn đoán F41.1 (rối loạn lo âu lan tỏa) khi chỉ định thuốc sulpirid.

CHỦ TỊCH HĐT & ĐT



Trần Siêm

KHOA DƯỢC

Đ/ S. Lương Thanh Lương

ĐV THÔNG TIN THUỐC

Lý Hòa Hùng

TLTK: 1. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
2. Dược thư quốc gia 2018