

Giá Rai, ngày 01 tháng 10 năm 2022

**THÔNG TIN THUỐC THÁNG 10/2022**  
(V/v thông tin thuốc mới Bambuterol Hydroclorid)

**Kính gửi: Các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Giá Rai.**

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **Bambuterol hàm lượng 10mg, 20mg** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

**1. Tên thương mại: Bambuterol 10 A.T; Hayex; Respamxol 20**

**2. Chỉ định**

Điều trị bệnh hen, co thắt phế quản và/hoặc tắc nghẽn đường hô hấp có thể hồi phục. (Riêng Bambuterol 10 A.T có thêm chỉ định Viêm phế quản mạn).

**3. Liều lượng**

- Người lớn: Liều khởi đầu 10mg. Có thể tăng liều đến 20mg sau 1 – 2 tuần, tùy theo hiệu quả lâm sàng.

- Người rối loạn chức năng gan: không nên dùng vì không thể dự đoán được sự chuyển hóa thành terbutalin.

- Bệnh nhân suy giảm chức năng thận ( $GFR \leq 50\text{ml/phút}$ ): Liều khởi đầu là 5mg, có tăng đến 10mg sau 1-2 tuần, tùy theo hiệu quả lâm sàng.

- Trẻ em: không khuyến cáo sử dụng. (Riêng Bambuterol 10 A.T thì trẻ em 6-12 tuổi: liều khởi đầu 10mg, có thể tăng đến 20mg sau 1- 2 tuần, tùy theo kết quả lâm sàng).

**4. Cách dùng:** Liều chỉ định 1 lần/ngày nên uống trước khi đi ngủ.

**5. Chống chỉ định**

- Mẫn cảm với bambuterol, terbutalin và các thành phần khác của thuốc.

- Trẻ em. Riêng Bambuterol 10 A.T không sử dụng cho trẻ dưới 5 tuổi.

- Phụ nữ có thai và cho con bú do dữ liệu dùng thuốc trên nhóm đối tượng này còn hạn chế.

**CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT**

**KHOA DƯỢC**

**ĐV THÔNG TIN THUỐC**



BS CKI: TRẦN SIÊM

us. Lương Chí Cường

Nguyễn Thị Tú Trần

TLTK: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

