

Giá Rai, ngày 04 tháng 11 năm 2022

**THÔNG TIN THUỐC THÁNG 11/2022**  
*(V/v thông tin thuốc TRIMETAZIDIN)*

*Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Giá Rai.*

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **TRIMETAZIDIN** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

**1. Dạng thuốc và hàm lượng:** Viên nén bao phim dạng 20mg, 35mg.

**2. Chỉ định:** Con đau thắt ngực ổn định.

Dùng cho người lớn trong liệu pháp bổ sung/hỗ trợ vào biện pháp trị liệu hiện có để điều trị triệu chứng ở bệnh nhân đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ hoặc bệnh nhân không dung nạp với các liệu pháp điều trị đau thắt ngực khác.

**3. Liều dùng và cách dùng**

– Đối với viên 20mg: Uống 1 viên/lần x 3 lần/ngày.

– Đối với viên 35mg: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày.

Lưu ý: uống cùng bữa ăn.

**4. Chống chỉ định**

– Quá mẫn các thành phần của thuốc.

– Bệnh nhân Parkinson, có triệu chứng Parkinson, run, hội chứng chân không nghỉ và các rối loạn vận động có liên quan khác

– Suy thận nặng (độ thanh thải creatinin <30ml/phút)

**5. Thận trọng**

– Trimetazidin có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm triệu chứng Parkinson (run, vận động chậm và khó khăn, tăng trương lực cơ). Khi gặp phải rối loạn vận động như các triệu chứng Parkinson, hội chứng chân bứt rứt, run, dáng đi không vững cần ngay lập tức ngừng sử dụng trimetazidin. Các trường hợp này ít xảy ra và thường hồi phục sau khi ngưng thuốc. Phần lớn bệnh nhân hồi phục sau khi ngưng thuốc khoảng 4 tháng. Nếu các triệu chứng Parkinson tiếp tục xảy ra quá 4 tháng sau khi ngưng thuốc, cần theo dõi và đánh giá bởi bác sĩ chuyên khoa thần kinh.

– Có thể gặp biểu hiện ngã, dáng đi không vững hoặc tụt huyết áp, đặc biệt ở các bệnh nhân đang dùng các thuốc điều trị tăng huyết áp.

– Cần thận trọng khi kê đơn trimetazidin cho đối tượng bệnh nhân suy thận mức độ trung bình, bệnh nhân trên 75 tuổi.

## 6. Tài liệu tham khảo

- Bộ Y Tế (2018), Thông tư 30/2018/TT-BYT ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
- Bộ Y Tế (2018), Dược thư quốc gia Việt Nam
- Cục quản lý dược (2012), Công văn số 18614/QLD-ĐK về việc đăng ký, lưu hành thuốc chứa hoạt chất Trimetazidin.
- Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT

KHOA DƯỢC


ĐV THÔNG TIN THUỐC-DLS



BS CKI: TRẦN SIÊM



Lương Chất Lương



Nguyễn Bình Khang