

Giá Rai, ngày 4 tháng 04 năm 2023

**THÔNG TIN THUỐC THÁNG 04/ 2023**  
(*V/v thông tin thuốc GLICLAZID 80mg*)

*Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Giá Rai.*

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **GLICLAZID 80mg** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

- 1. Tên thương mại: GLYCINORM-80**
- 2. Loại thuốc:** Thuốc chống đái tháo đường, dẫn chất Sulfonylurea.
- 3. Dạng thuốc và hàm lượng:**
  - Viên nén không bao tròn màu trắng đến trắng ngà.
  - Hàm lượng: 80mg.
- 4. Chỉ định, liều dùng, cách dùng:**
  - 4.1. Chỉ định  
Đái tháo đường týp 2 (không lệ thuộc insulin).
  - 4.2. Liều dùng
    - Nên điều chỉnh liều theo đáp ứng của bệnh nhân, bắt đầu với 40-80mg mỗi ngày (1/2-1 viên).
    - Một liều đơn duy nhất không được vượt quá 160mg (2 viên). Khi cần liều cao hơn, nên uống Gliclazid hai lần mỗi ngày vào các bữa ăn chính.
    - Suy thận nhẹ đến trung bình: Nên sử dụng liều tối thiểu hàng ngày 40-80mg (1/2-1 viên).

*Nên uống thuốc vào các bữa ăn chính.*
- 5. Chống chỉ định:**
  - Quá mẫn với các thành phần của thuốc hoặc các sulfonylurea khác.
  - Đái tháo đường týp 1.
  - Đái tháo đường có biến chứng nhiễm toan, nhiễm ceton.
  - Hôn mê hay tiền hôn mê do đái tháo đường.
  - Suy thận nặng, suy gan nặng.
  - Cho con bú.
- 6. Thận trọng:**

- Tụt đường huyết: Thuốc ít gây hạ glucose máu hơn các loại Sulfonylurea khác, nhưng vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, nên thận trọng với nhóm bệnh nhân suy dinh dưỡng, bỏ bữa, mất cân bằng tập thể dục, dùng đồng thời với rượu.

- Rối loạn đường huyết: Bao gồm tụt đường huyết và tăng đường huyết khi điều trị đồng thời với Fluoroquinolones đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi.

- Kiểm soát đường huyết kém: Ở nhóm bệnh nhân đang bị sốt, chấn thương, nhiễm khuẩn hoặc phẫu thuật can thiệp sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết.

#### 7. Tương tác thuốc:

- Không nên phối hợp với các thuốc sau vì có khả năng làm **tăng nguy cơ hạ đường huyết**: + Miconazol (đường toàn thân, gel bôi miệng) ⇔ chống chỉ định phối hợp.

+ Phenylbutazon, rượu.

- Không nên phối hợp với các thuốc sau vì có khả năng làm **tăng đường huyết**: Chlorpromazin, Glucocorticoid, Salbutamol và Terbutaline (dạng tiêm).

- Điều trị chống đông máu Warfarin: Các Sulfonylurea có thể dẫn đến việc chống đông máu trong quá trình điều trị đồng thời.

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT

KHOA DƯỢC

ĐV THÔNG TIN THUỐC-DLS



BS CKI: TRẦN SIÊM

DSCKII Lương Chất Lương

DS. Nguyễn Diễm My

TLTK: *Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc GLYCINORM-80, Dược thư quốc gia Việt Nam (2018).*