

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 05/2024
(V/v cập nhật thông tin thuốc Grafort 3g)

Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn-hợp lý cho điều trị, đơn vị thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin thuốc **Grafort 3g** trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

1. Tên biệt dược: Grafort 3g

2. Hoạt chất: Dioctahedral Smectite 3g

3. Dạng thuốc và hàm lượng: Hỗn dịch 3g

4. Dược lực học:

Với cấu trúc từng lớp và độ nhầy cao, Grafort có khả năng bao phủ niêm mạc tiêu hóa rất lớn. Grafort tương tác với glycoprotein của chất nhầy làm tăng sức chịu đựng của lớp gel dính trên niêm mạc bị tấn công, nhờ đó, Grafort bảo vệ được niêm mạc tiêu hóa. Grafort không làm thay đổi thời gian nhu động của ruột.

5. Dược động học: Grafort không được hấp thu và được đào thải qua phân.

6. Chỉ định:

- Điều trị các triệu chứng đau trên bệnh viêm thực quản, dạ dày và ruột.
- Tiêu chảy cấp và mạn tính sau khi đã bù đủ nước và điện giải.

7. Cách dùng và Liều dùng:

- Trẻ em:

- Dưới 6 tháng tuổi: ½ gói (10ml)/ lần x 2/ngày.
- 6 tháng – 5 tuổi: ½ gói (10ml)/ lần x 3/ngày.
- Trên 5 tuổi : 1 gói (20ml)/ lần x 2 – 3/ngày.

- Người lớn : 1 gói (20ml)/ lần x 3 – 4 /ngày.

8. Chống chỉ định:

- Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần của thuốc.
- Bệnh nhân bị tắc ruột.
- Trẻ em bị tiêu chảy cấp có mất nước và điện giải.


9. Thận trọng:

- Phải bù nước nếu cần (bằng đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch) tùy theo tuổi, cơ địa bệnh nhân và mức độ mất nước do tiêu chảy.
- Khi có sốt không dùng thuốc này quá 2 ngày.

- Thận trọng khi dùng Dioctahedral smectit để điều trị tiêu chảy nặng vì thuốc có thể làm thay đổi độ đặc của phân và chưa biết có ngăn được mất nước và điện giải còn tiếp tục trong tiêu chảy cấp.

TLTK: *Tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc.*

CHỦ TỊCH HĐT & ĐT



BS.CKII. Trần Hồng Dũng

Gia Rai, ngày 17 tháng 05 năm 2024
KHOA DƯỢC-TTB-VTYT ĐV THÔNG TIN THUỐC

DS.CKII. Lương Chất Lường

DS.Nguyễn Bình Khang