

Giá Rai, ngày 05 tháng 07 năm 2024

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 07/ 2024
(V/v thông tin thuốc MOXIFLOXACIN 400mg)

Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **MOXIFLOXACIN 400mg** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

1. **Tên thương mại:** MOLOXCIN400
2. **Loại thuốc:** Kháng sinh nhóm fluoroquinolon
3. **Dạng thuốc và hàm lượng:** Viên nén bao phim 400mg
4. **Chỉ định, liều dùng:**

4.1. Chỉ định

Moxifloxacin được chỉ định điều trị ở bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên có các bệnh nhiễm khuẩn sau:


- Viêm phổi măc phải cộng đồng, trừ trường hợp nặng
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm có biến chứng (chỉ nên dùng khi các kháng sinh thông thường khác không phù hợp)
- Đợt cấp của viêm phế quản mạn tính
- Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn
- Bệnh viêm vùng chậu từ nhẹ đến vừa

4.2. Liều dùng

- Người lớn: Liều khuyến cáo 400mg x 1 lần/ngày

Không cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân có chức năng thận suy giảm từ nhẹ đến nặng hoặc ở bệnh nhân phải lọc máu kéo dài

- Thời gian điều trị:
 - + Viêm phổi măc phải cộng đồng: 10 ngày
 - + Bệnh viêm vùng chậu từ nhẹ đến vừa: 14 ngày
 - + Đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bao gồm viêm phế quản: 5-10 ngày
 - + Viêm xoang cấp tính do vi khuẩn: 7 ngày



Không nên dùng vượt quá liều khuyến cáo và thời gian điều trị được chỉ định

5. Chống chỉ định:

- Quá mẫn với Moxifloxacin, kháng sinh nhóm quinolon hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Thời kỳ mang thai và cho con bú
- Bệnh nhân dưới 18 tuổi
- Bệnh nhân có tiền sử/ rối loạn gan cơ liên quan đến dùng thuốc quinolon
- Rối loạn điện giải, đặc biệt hạ kali máu không được điều chỉnh

- Nhịp tim chậm có liên quan đến lâm sàng
- Kéo dài khoảng QT bẩm sinh hoặc mắc phải
- Suy tim có liên quan đến lâm sàng với giảm phân suất tổng máu thất trái
- Tiền sử rối loạn nhịp tim có triệu chứng
- Bệnh nhân suy giảm chức năng gan và tăng transaminase > 5 lần trên giới hạn bình thường

6. Thận trọng:

- Các phản ứng có hại nghiêm trọng có khả năng không hồi phục và gây tàn tật, bao gồm viêm gan, đứt gan, bệnh lý thần kinh ngoại biên và các bất lợi trên thần kinh trung ương nên sử dụng thận trọng
- Nếu có các dấu hiệu rối loạn nhịp tim xảy ra trong quá trình điều trị phải ngừng điều trị và đo điện tâm đồ
- Cần làm xét nghiệm/ kiểm tra chức năng gan trong trường hợp có dấu hiệu rối loạn chức năng gan
- Ở bệnh nhân đái tháo đường cần theo dõi chặt chẽ đường huyết

7. Tương tác thuốc:

Chống chỉ định dùng đồng thời Moxifloxacin với các thuốc sau đây vì tăng nguy cơ loạn nhịp thất, bao gồm cả xoắn đinh:

- Theo quyết định 5948/QĐ-BYT ngày 30/12/2021 như sau: Domperidon, Clorpromazin, Escitalopram, Haloperidol, Thioridazine, Citalopram, Piperaquin/ dihydroartemisinin(piperaquin)
- Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm IA (quinidin, hydroquinidin, disopyramid)
- Thuốc chống loạn nhịp tim nhóm III (amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid)
- Một số chất kháng khuẩn (saquinavir, sparfloxacin, erythromycin IV, pentamidin, thuốc chống sốt rét đặc biệt là halofantrin)
- Một số thuốc kháng histamin (terfenadin, astemizol, mizolastine)
- Các thuốc khác (cisaprid, vincamin IV, bepridil, diphenanil).



CHỦ TỊCH HĐT & ĐT

BS.CKII.Trần Hồng Dũng

KHOA DƯỢC

DS.CKII.Lương Chất Lường

ĐV THÔNG TIN THUỐC-DLS

DS.CKI.Nguyễn Diễm My

TLTK: - *Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Moloxcin 400*

- Được thư quốc gia Việt Nam 2022
- Quyết định số 5948/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2021