

Giá Rai, ngày 06 tháng 08 năm 2024

**THÔNG TIN THUỐC THÁNG 8/2024**  
(*V/v thông tin thuốc Doxazosin*)

**Kính gửi:** Các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **Doxazosin** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

- 1. Thành phần biệt dược, hoạt chất, hàm lượng:** Doxazosin (Schaaf) 2mg
- 2. Nhóm dược lý:** Thuốc ức chế thụ thể alpha-adrenergic.

**3. Liều dùng:**

- Người lớn:

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt : *Liều khởi đầu là 1mg x 1 lần/ngày uống trước khi ngủ. Có thể tăng lên 2mg, 4mg đến tối đa 8mg/ ngày, tăng liều cách nhau 1 – 2 tuần. Khuyến cáo 2 – 4mg/ngày.*

Bệnh tăng huyết áp: *Liều khởi đầu là 1mg x 1 lần/ngày uống trước khi ngủ. Có thể tăng lên 2mg x 1 lần/ngày; cứ 2 tuần lại cho liều gấp đôi đến khi kiểm soát huyết áp.*

- Trẻ em: An toàn và hiệu quả của Doxazosin trên trẻ em chưa được thiết lập

- 4. Cách dùng:** dùng đường uống, có thể bẻ đôi. Uống vào buổi sáng hoặc tối


**5. Chỉ định:**

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt: Doxazosin có thể dùng cho những người bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt có tăng huyết áp hoặc huyết áp bình thường.

Bệnh tăng huyết áp.

**6. Chống chỉ định:**

- Quá mẫn với doxazosin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Bệnh nhân có tiền sử hạ huyết áp tư thế.



- Bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt và đồng thời bị tắc nghẽn đường tiết niệu trên, nhiễm trùng đường tiết niệu mạn tính hoặc sỏi bàng quang.
- Phụ nữ cho con bú.
- Bệnh nhân bị tụt huyết áp (chỉ cho chỉ định phì đại lành tính tuyến tiền liệt)
- Đơn trị liệu tràn bàng quang, vô niệu kèm hoặc không kèm suy thận tiến triển

### 7. Dược lực học:

Phì đại lành tính tuyến tiền liệt: đối kháng có chọn lọc làm giảm trương lực trên cơ bóp tuyến tiền liệt, màng bọc tiền liệt, đáy bàng quang và niệu đạo qua trung gian các thụ thể alpha-adrenergic, làm giảm áp lực niệu đạo và lực cản bài niệu, giải thoát tiểu tiện và làm chuyển biến các triệu chứng phì đại lành tính tuyến tiền liệt.

Bệnh tăng huyết áp: làm giảm sức cản ngoại vi do giãn mạch, giảm lượng máu từ tĩnh mạch về tim. Thuốc tác dụng tại thụ thể alpha trên cơ trơn mạch và các cơ trơn khác.

### 8. Dược động học:

- Hấp thu: Nồng độ đỉnh sau dùng thuốc 2 – 3 giờ. Sinh khả dụng khoảng 65%
- Phân bố: Khoảng 98% liên kết với protein huyết tương.
- Chuyển hóa: Thuốc chuyển hóa phần lớn ở gan
- Thải trừ: qua phân, thời gian bán thải 22 giờ. Không bị loại trừ kthâm tách máu


Tài liệu tham khảo: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Giá Rai, ngày 06 tháng 08 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT

KHOA DƯỢC -TTB-VTYT

ĐV THÔNG TIN THUỐC


BS. CKII. Trần Hồng Dũng

DS. CKII. Lương Chất Lường

Ths. DS. Bùi Nguyễn Hạnh Nhân