

Giá Rai, ngày 01 tháng 8 năm 2024

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 8 /2024
(*V/v thông tin thuốc Vinfadin LP40*)

Kính gửi: Các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc *Vinfadin LP40* có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

- 1. Thành phần hoạt chất, hàm lượng:** Famotidin.....40mg
- 2. Nhóm dược lý:** Đối kháng thụ thể histamin H2
- 3. Dạng bào chế:** Thuốc tiêm đông khô
- 4. Liều dùng:**

Loét tá tràng dai dẳng hoặc người bệnh không uống được

- Người lớn: 20mg (đường tĩnh mạch) x 2 lần/ngày

- Trẻ em từ 1- 16 tuổi: Không quá 40mg/ ngày

0,25mg/ kg (Tiêm tĩnh mạch chậm hoặc truyền tĩnh mạch) x 2 lần/ ngày

Các bệnh lý tăng tiết dịch vị : Dùng đường tĩnh mạch: 20mg x 3-4 lần/ ngày.

5. Cách dùng:

Tiêm tĩnh mạch: Hòa tan hoàn toàn 1 lọ thuốc tiêm đông khô với 10ml nước vô khuẩn để tiêm, tiêm tĩnh mạch chậm ít nhất trong 3 - 5 phút .

Tiêm truyền tĩnh mạch: Hòa tan hoàn toàn 1 lọ thuốc tiêm đông khô với 10 ml nước vô khuẩn để tiêm, sau đó pha loãng đến 200 ml bằng dung dịch tiêm truyền dextrose 5%, natri 0,9% hoặc dung dịch tiêm truyền tương hợp khác truyền trong 30 – 60 phút.

Lưu ý: Sau khi pha loãng, dung dịch tiêm famotidin phải dùng ngay hoặc bảo quản ở nhiệt độ 2 – 8 °C, không đông đá và dùng trong 24 giờ.

6. Chỉ định:

- Loét tá tràng thể hoạt động. Điều trị duy trì trong loét tá tràng
- Loét dạ dày lành tính thể hoạt động
- Bệnh trào ngược dạ dày thực quản
- Bệnh tăng bài tiết ở đường tiêu hóa như hội chứng Zollinger – Ellison, đau u tuyến nội tiết.

7. **Chống chỉ định:** Mẫn cảm với famotidin, các thuốc đối kháng thụ thể histamin H2 khác hoặc bất kỳ thành phần nào của chế phẩm.

8. Dược lực học:

Famotidin ức chế cạnh tranh tác dụng của histamin tại thụ thể H2 ở tế bào thành dạ dày, nên làm giảm thể tích và giảm nồng độ acid dạ dày.

9. Dược động học:

- Khoảng 15- 20% thuốc liên kết với protein huyết tương. Thời gian bán thải ở người có chức năng thận bình thường là 2,5 – 4 giờ .
- Thuốc thải trừ chủ yếu qua thận

TLTK: *Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc .*


Giá Rai, ngày 01 tháng 8 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT



BS. CKII. Trần Hồng Dũng

KHOA DƯỢC -TTB-VTYT



DS. CKII. Lương Chất Lường

ĐV THÔNG TIN THUỐC



DS. CKI. Trần Chúc Ly