

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 02/ 2026
(V/v thông tin thuốc **DOXAZOSIN 4mg**)

Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị thuộc Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Dược lâm sàng - Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **DOXAZOSIN 4mg** có trong danh mục thuốc Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai tế như sau:

1. Tên hoạt chất: Doxazosin

2. Loại thuốc: Thuốc ức chế chọn lọc thụ thể alpha1-adrenergic

3. Dạng bào chế và hàm lượng: Viên nén 4mg.

4. Chỉ định:

- *Tăng huyết áp:* Doxazosin được chỉ định trong điều trị tăng huyết áp có thể dùng đơn độc hoặc phối hợp với thuốc khác như lợi tiểu thiazide, chẹn beta giao cảm, chẹn kênh calci hoặc ức chế men chuyển.

- *Phì đại lành tính tiền liệt tuyến:* Doxazosin được chỉ định trên bệnh nhân *phì đại lành tính tiền liệt tuyến có triệu chứng đường tiểu dưới* và có hoặc không có bệnh lý tăng huyết áp.

5. Chống chỉ định:

- Quá mẫn với dẫn chất quinazolin hoặc với bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc.

- Bệnh nhân có tiền sử hạ huyết áp tư thế.

- Bệnh nhân bị phì đại lành tính tiền liệt tuyến có kèm theo sung huyết đường tiết niệu trên, nhiễm khuẩn đường tiết niệu mạn tính hoặc sỏi bàng quang.

- Bệnh nhân bị huyết áp thấp.

- Đơn trị liệu cho những bệnh nhân vô niệu có kèm hoặc không kèm suy thận tiến triển.

6. Cách dùng, liều dùng:

* *Cách dùng:* Doxazosin có thể uống vào buổi sáng hoặc buổi tối, ngày 1 lần (khuyến cáo nên dùng thuốc vào buổi tối để tránh hạ huyết áp tư thế).

* *Liều dùng:*

- *Tăng huyết áp:* Liều khởi đầu 1mg/lần/ngày, sau một hoặc hai tuần điều trị có thể tăng lên 2mg - 4mg, ngày 1 lần. Liều tối đa có thể đến 16mg/ ngày (*lưu ý: phần lớn bệnh nhân đáp ứng ở liều 4mg/ ngày hoặc thấp hơn*).

- *Phì đại lành tính tiền liệt tuyến*: Liều khởi đầu được khuyến cáo 1mg/lần/ngày để giảm thiểu nguy cơ hạ huyết áp tư thế. Tùy theo triệu chứng bệnh có thể tăng lên 2mg, sau đó 4mg, liều tối đa được khuyến cáo 8mg.

- *Sử dụng ở người cao tuổi*: Khuyến cáo dùng liều thông thường như ở người lớn.

- *Sử dụng ở bệnh nhân suy thận*: Dùng liều như người lớn bình thường.

- *Sử dụng ở bệnh nhân suy gan*: Cần thận trọng khi dùng cho bệnh nhân suy gan.

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Hạ huyết áp tư thế /ngất

- Thuốc có nguy cơ làm mềm móng mắt nên cần cẩn thận đối với người bệnh được chỉ định phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể.

8. Tương tác thuốc:

- Doxazosin làm tăng tác dụng hạ huyết áp của các thuốc chẹn alpha khác và các thuốc chống tăng huyết áp khác.

- Sử dụng đồng thời với chất ức chế PDE-5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) có thể dẫn đến hạ huyết áp có triệu chứng.

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT

KHOA DƯỢC -TTB-VTYT

DƯỢC LÂM SÀNG - TTT



Nguyễn Thúy Sơn

Trần Chí Lý
Ds. CKI Trần Chí Lý

Tài liệu tham khảo: - Quyết định số: 1531/QĐ-BYT, ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế;
- Dược thư quốc gia Việt Nam 2022;
- Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc DOXAZOSIN 4mg.