

Giá Rai, ngày 27 tháng 3 năm 2025

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 03/2025

(V/v cập nhật thông tin thuốc **CARVEDILOL DWP 10mg**)

Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị Trung tâm Y tế Thị Xã Giá Rai.

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn- hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **CARVEDILOL DWP 10mg** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

1. **Tên chung quốc tế:** **CARVEDILOL**

2. **Nhóm dược lý:** Thuốc ức chế thụ thể beta và alpha 1- Adrenergic.

3. **Dạng thuốc và hàm lượng:** viên nén **Carvedilol DWP 10mg**

4. **Chỉ định:**

- Tăng huyết áp
- Đau thắt ngực.
- Điều trị phụ trợ cho suy tim mạn tính do thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc bệnh cơ tim giãn.
- Rung nhĩ.

5. **Chống Chỉ định:**


- Hen phế quản hoặc co thắt phế quản.
- Hạ huyết áp nặng (huyết áp tâm thu <85mmHg)
- Chậm nhịp tim nặng (<50 nhịp/phút), block nhĩ thất (độ II,III).
- Sốc tim, hội chứng suy nút xoang.
- Suy tim mất bù, bệnh nhân suy tim cần dùng thuốc kích thích tim hoặc thuốc giãn mạch tiêm tĩnh mạch.
- Suy tim phải do tăng áp động mạch phổi
- U tủy thượng thận không được điều trị.
- Suy gan có triệu chứng.
- Nhiễm toan Ceton do đái tháo đường, nhiễm toan chuyển hóa.
- Phụ nữ có thai hoặc có thể có thai.
- Quá mẫn với carvedilol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

6. **Cách dùng và Liều dùng:**

❖ **Tăng huyết áp:** Người lớn: 10-20mg, 1 lần/ngày.

❖ **Đau thắt ngực ổn định mạn tính:** Liều thường dùng cho người lớn: 10-20mg/ngày, chia 1-2 lần/ngày.

Nếu cần có thể tăng thêm, cách nhau ít nhất 2 tuần cho đến tối đa 100mg, chia làm 2 lần/ngày. Đối với người cao tuổi khuyến cáo tối đa là 25mg, ngày uống 2 lần.



❖ **Suy tim:** Trước khi bắt đầu liệu pháp carvedilol cho suy tim sung huyết, người bệnh phải được điều trị suy tim với phác đồ chuẩn gồm: glycosid trợ tim, thuốc lợi tiểu, và/hoặc thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin, phải được ổn định với liều các thuốc đó ít nhất 4 tuần trước khi điều trị.

Người lớn liều khởi đầu: 1,25mg/lần x 2 lần/ngày. Nếu dung nạp được, tăng liều dần dần (trong khoảng 1 tuần hoặc hơn) cho đến khi không dung nạp. Luôn tăng hoặc giảm liều dần dần từ 1,25mg, 2,5mg, 5mg, 10mg, và luôn uống 2 lần/ngày, uống sau ăn. Liều duy trì thường từ 2,5-10mg, 2 lần/ngày. Liều khởi đầu có thể thấp hơn tùy theo tuổi và triệu chứng. Liều duy trì sẽ được tăng hoặc giảm tùy theo đáp ứng của bệnh nhân với thuốc.

❖ **Rung nhĩ:**

Người lớn: Liều thường dùng 5mg/lần/ngày, nếu tác dụng không đủ, tăng dần liều lên 10mg và 20mg/lần/ngày.

⚡ **Đối tượng đặc biệt:**

Suy thận: Liều dùng phải được xác định cho từng bệnh nhân, nhưng theo các thông số dược động học, không có bằng chứng cho thấy điều chỉnh liều của carvedilol ở bệnh nhân suy thận là cần thiết.

Rối loạn chức năng gan mức độ trung bình: có thể yêu cầu điều chỉnh liều.

Người cao tuổi: Carvedilol chuyển hóa chủ yếu ở gan. Nồng độ carvedilol trong máu tăng cao đã được quan sát thấy ở bệnh nhân có rối loạn chức năng gan nặng. Ở người cao tuổi, chức năng gan thường bị suy giảm, nồng độ carvedilol trong máu có thể tăng lên, làm giảm huyết áp quá mức (có khả năng xảy ra nhồi máu não...). Thận trọng khi sử dụng, khởi đầu với liều thấp và theo dõi cẩn thận tình trạng bệnh nhân.

Tài liệu tham khảo: (1). Bộ Y tế (2022), *Dược thư quốc gia Việt Nam*, tr. 374-377, NXB Khoa học – Kỹ thuật; (2) Tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc.

Giá Rai, ngày 27 tháng 3 năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT & ĐT

KHOA DƯỢC-TTB-VTYT

ĐV THÔNG TIN THUỐC



Bs.CKII. Trần Hồng Dũng

Ds.CKII. Lương Chất Lường

Ds.CKI. Bùi Thị Ái Ngân