

Giá Rai, ngày 05 tháng 09 năm 2025

**THÔNG TIN THUỐC THÁNG 09/ 2025**  
(V/v thông tin thuốc **ORIS**)

*Kính gửi: Các khoa, phòng điều trị thuộc Trung tâm Y tế khu vực Giá Rai.*

Nhằm mục đích sử dụng thuốc an toàn - hợp lý và kịp thời cho điều trị, đơn vị Thông tin thuốc xin tóm tắt thông tin về thuốc **ORIS** có trong danh mục thuốc Trung tâm y tế như sau:

**1. Tên hoạt chất: OFLOXACIN**

**2. Loại thuốc:** Kháng sinh nhóm Quinolon

**3. Dạng bào chế và hàm lượng:** Dung dịch truyền tĩnh mạch 200mg/100ml. Dung dịch trong suốt có màu vàng xanh

**4. Chỉ định:**

Ofloxacin được chỉ định điều trị ở bệnh nhân **từ 18 tuổi trở lên** có các bệnh nhiễm khuẩn sau:

- Viêm phổi, nhiễm khuẩn đường hô hấp (viêm phế quản) cấp tính, mạn tính
- Nhiễm khuẩn da, mô mềm
- Nhiễm trùng ổ bụng, tiêu chảy do vi khuẩn
- Nhiễm khuẩn thận, đường tiết niệu và cơ quan sinh dục, bệnh lậu
- Nhiễm trùng xương (viêm xương, viêm tủy xương) và khớp
- Viêm xoang cấp
- Nhiễm khuẩn tai mũi họng mạn tính và tái phát đặc biệt do vi khuẩn gram âm
- Nhiễm khuẩn máu

**5. Chống chỉ định:**

- Quá mẫn với Ofloxacin, kháng sinh nhóm quinolon hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc
- Bệnh động kinh và khi bệnh nhân có giảm ngưỡng co giật thần kinh trung ương

- Bệnh nhân dưới 18 tuổi
- Phụ nữ mang thai và cho con bú
- Bệnh nhân rối loạn phát sinh cơ gân sau khi sử dụng các quinolon

#### 6. Liệu dùng, cách dùng:

- Trong nhiễm khuẩn cấp tính, điều trị 7 đến 10 ngày. Thời gian thông thường điều trị đối với vi khuẩn *Salmonella* là 7-8 ngày, *Shigella* 3-5 ngày và 3 ngày với nhiễm khuẩn đường ruột *Escherichia coli*
- Thời gian điều trị 3 ngày thường là đủ đối với các nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới không biến chứng
- Trong trường hợp nhiễm trùng xương điều trị kéo dài 3-4 tuần hoặc lâu hơn trong một số trường hợp
- Những bệnh nhân có chức năng thận bình thường: Đợt nhiễm khuẩn cấp của viêm phế quản mạn tính, viêm phổi mắc phải cộng đồng: 200mg x 2 lần mỗi ngày
- Dung dịch truyền tĩnh mạch Ofloxacin 200mg được **truyền tĩnh mạch chậm trong khoảng thời gian 60 phút**

#### 7. Tương tác thuốc:

- Heparin và dung dịch truyền tĩnh mạch Ofloxacin 200mg không được trộn lẫn với nhau vì có nguy cơ kết tủa
- Sử dụng đồng thời với insulin hoặc các loại thuốc uống hạ đường huyết (glyburide/glibenclmid) sẽ làm tăng tác dụng hạ đường huyết của các loại thuốc này.



CHU TỊCH HĐT & ĐT

KHOA DƯỢC

ĐV THÔNG TIN THUỐC-DLS

BS.CKII.Trần Hồng Dũng

DS.CKII.Lương Chất Lượng

DS.CKI.Nguyễn Diễm My

TLTK: - *Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc ORIS*  
 - *Dược thư quốc gia Việt Nam 2022*